

# TAMIZAJE Y TRIAGE

## PARA EL RECONOCIMIENTO TEMPRANO DE PACIENTES CON SOSPECHA DE COVID-19 Y RÁPIDA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE FUENTES




En el ámbito de salud,

**tamizaje y triage NO es lo mismo.**


**Tamizaje:** "uso de un método aplicado a una población saludable, para identificar a aquellos individuos que tienen alguna patología".

**Triage:** "clasificar a los pacientes de acuerdo con la necesidad de la atención al momento de llegar al servicio de salud o de acuerdo síntomas y signos específicos".

El **tamizaje y triage** consisten en un sistema de evaluación de todos los pacientes en el momento del ingreso al servicio para reconocer de forma temprana los posibles casos de infección por **SARS-CoV-2 (reconocimiento temprano)** aislando, en una zona separada de los demás pacientes, a aquellos presuntamente infectados con este virus, proceso al que se conoce como **control de la fuente de infección**.




Para la instalación de la zona de tamizaje y triage se puede **emplear estructuras desplegadas (carpas, contenedores) o instalaciones físicas del establecimiento** definidas y reorganizadas para tal fin. La zona del tamizaje y triage **deberá funcionar 24 horas, 7 días** a la semana. Se recomiendan considerar las siguientes áreas:



**Tabla 1. Recomendaciones para zona de tamizaje y triage de pacientes con síntomas respiratorios**

**Ingreso y espera: zona de tamizaje**

Delegar personal para el tamizaje para asegurar una evaluación oportuna de pacientes con síntomas **sospechosos de COVID-19**.



Todos los pacientes **sospechosos de COVID-19** deben usar mascarillas quirúrgicas como una actividad de control de fuentes de infecciones.



Implementar un proceso para reducir la cantidad de tiempo que las personas con **sospecha de COVID-19** esperan para ser tamizadas



Designar y señalar en el servicio de salud la **zona de rutina**, las cuales serán utilizadas por pacientes que **NO presente síntomas sospechosos de COVID-19**.


Designar y señalar en el servicio de salud la **zona del triage**, las cuales serán para pacientes que **SI presenten síntomas sospechosos de COVID-19**.

En el área de ingreso, **colocar señales en el piso que separe al menos 1 metro un paciente de otro.**



**COVID-19**

Mostrar información en la entrada de la instalación donde se informe que **cualquier paciente con signos y síntomas de COVID-19 debe hacerlo saber al personal de salud y dirigirse a la zona de triage establecida.**



Garantizar que el personal de salud mantenga una distancia de al menos **1 metro de los pacientes**, idealmente con una separación creada por una pantalla de vidrio/plástico. Si eso es no es posible, utilizar la mascarilla quirúrgica y barrera facial.



## Toma de signos



Capacitar al personal de salud sobre los signos y síntomas de **COVID-19**



y las definiciones de casos más recientes




Asegurar que el personal tenga acceso a suministros y equipo de protección personal adecuados (PPE), basado en las guías de uso racional de EPP de OMS;



La toma de signos del paciente consiste en la

**toma de la temperatura** (de preferencia con termómetro infrarrojo) y la **saturación de oxígeno;**



el personal procederá a la desinfección del

equipo utilizado antes y después de su uso.



## Ingreso de datos



El expediente con información del paciente será llevado por el personal de la **zona de triage** en todo momento y no entrará en contacto directo con el paciente.

Establecer cuestionarios de **detección** de acuerdo con las definiciones de casos más recientes de las autoridades nacionales y/o agencias internacionales como OMS




## Sala de espera (previa al triage)

Zona del triage



Una vez ingresados los datos, el paciente será dirigido a la sala de espera previa al triage. Las sillas de esta área deberán contar con una separación de 1 metro entre ellas.



**Referencias:**

Infection prevention and control during health care when coronavirus disease (COVID-19) is suspected or confirmed; Interim guidance; 29 June 2020; World Health Organization (WHO)

COVID-19 Recomendaciones técnicas para configuración de una zona de triaje de pacientes con síntomas respiratorios; documento provisional 5 abril 2020; Panamerican Health Organization (PAHO)



**PROYECTO CUIDADO Y TRATAMIENTO EN VIH**

*"Este material sobre prevención y control de infecciones, con énfasis en SARS-CoV2 es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido es responsabilidad de IntraHealth y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos de América".*