

MIDIENDO EL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

Paso

1

La implementación de medidas para disminuir el riesgo de infección se inicia con la realización de:

- a. diagnóstico situacional
- b. análisis de cierre de brechas
- c. construcción del plan de control de infecciones

Paso

2

Velar por el cumplimiento del plan, sobre todo para que se dé el cierre de brechas en el tiempo estipulado.

- a. Será necesario reunirse de forma periódica para evaluar la implementación.
- b. Es recomendable hacer mediciones de seguimiento cada 3 a 6 meses, con el fin de obtener una medida numérica del avance en las actividades.

Paso

3

Identificar indicadores de proceso que permitan cuantificar la mejora en las medidas de prevención y control de infecciones, las cuales serán detalladas en el plan y su medición se realizará de forma regular.

En la parte final del anexo 3 (*Formato genérico del plan de control de infecciones de COVID-19*), se presenta una serie de indicadores mínimos que se deben medir para asegurar que el riesgo de transmisión dentro del establecimiento de salud se encuentra en un nivel aceptable.

Referencias:

1. Infection prevention and control during health care when coronavirus disease (COVID-19) is suspected or confirmed; Interim guidance; 29 June 2020; World Health Organization (WHO)
2. COVID-19 Strategic Preparedness and Response (SPRP) Monitoring and Evaluation Framework; 5 June 2020; World Health Organization (WHO)



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



PROYECTO CUIDADO Y TRATAMIENTO EN VIH

"Este material sobre prevención y control de infecciones, con énfasis en SARS-CoV2 es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido es responsabilidad de IntraHealth y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos de América".